



Zasady refundacji systemu ciągłego monitorowania glikemii flash od 1 stycznia 2023 roku*



WAŻNE! Dla wystawienia pierwszego zlecenia niezbędne jest zakwalifikowanie pacjenta do jednej ze wskazanych grup, bez dodatkowych kryteriów klinicznych.

GRUPY OBJĘTE REFUNDACJĄ I ZAKRES ODPLATNOŚCI

GRUPA PACJENTÓW	ZAKRES ODPLATNOŚCI	CENA 14-DNIOWEGO SENSORA DLA PACJENTA
Dzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3	20%	51 zł
Osoby powyżej 18. roku życia wymagające min. 3 wstrzyknięć insuliny w ciągu doby (intensywna insulinoterapia)	30%	76,5 zł
Kobiety z cukrzycą stosujące insulinę w okresie ciąży i połogu		
Osoby chorujące na cukrzycę, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – ze względu na stan wzroku, leczone insuliną		

WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

Wystawienie zlecenia przez uprawnionego lekarza na okres do 6 miesięcy oraz weryfikacja i potwierdzenie zlecenia przez NFZ np. za pośrednictwem platformy eZWM. **Maksymalnie 3 sensory miesięcznie, do 13 szt. w okresie 6 miesięcy, do 26 sensorów rocznie.**

Zlecenie może być zrealizowane przez pacjenta na stronie www.diabetyk24.pl lub telefonicznie pod numerem **+48 22 464 86 86**



KTO MOŻE WYSTAWIĆ ZLECENIE?

Lekarze ze specjalizacją z:

- Diabetologii
- Endokrynologii i diabetologii dziecięcej
- Endokrynologii i pediatrii
- Kardiologii
- Endokrynologii
- Geriatrii
- Położnictwa i ginekologii
- Perinatologii
- Endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
- Pediatrii lub chorób wewnętrznych (lekarz zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii)

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.



WAŻNE! KONTYNUACJA REFUNDACJI

Aby móc wystawić kolejne zlecenie pacjent musi spełnić kryteria w zależności od populacji refundacyjnej.

KRYTERIA KONTYNUACJI ZLECENIA DLA WSKAZANYCH GRUP

GRUPA PACJENTÓW	KRYTERIA KONTYNUACJI	ŚREDNI MIESIĘCZNY LIMIT REFUNDOWANYCH PASKÓW
Dzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3	Co najmniej 8 skanów na dobę	50 szt.
Osoby powyżej 18. roku życia wymagające min. 3 wstrzyknięć insuliny w ciągu doby (intensywna insulinoterapia)	<ol style="list-style-type: none">ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;TIR (time in range) w zakresie 70–180 mg/dl >70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w okresie użytkowania zrefundowanych czujników	25 szt.
Kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą, wymagające insulinoterapii	Brak	50 szt.
Dorośli z cukrzycą, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, leczeni insuliną		